



Lo mejor en salud animal!!



andrés pintaluba

apsa**SOL**
antibióticos solubles

APSASOL DOXYCYCLINE


Doxiciclina 500 mg / g - Medicamento oral

Solución oral en polvo



APSASOL DOXYCYCLINE

Doxiciclina 500 mg / g - Medicamento oral



COMPOSICIÓN

Cada gramo contiene:

Doxiciclina (hclato)	500 mg
Excipientes c.s.p.	1g

APSASOL DOXYCYCLINE es un antibiótico a base de tetraciclina semisintética.

Las tetraciclinas tienen una acción de amplio espectro que inhiben las bacterias gram positivas y gram negativas, micoplasmas, clamidias, rickettsias y algunos protozoos.

La acción de la doxiciclina se basa en la inhibición de la síntesis proteínica bacteriana.

INDICACIONES

APSASOL DOXYCYCLINE está destinado para el tratamiento de las siguientes infecciones del aparato respiratorio y del tracto digestivo causadas por microorganismos sensibles a la doxiciclina.

CERDOS

Tratamiento de enfermedades respiratorias complejas porcinas causadas por *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida* spp. y *Bordetella bronchiseptica* sensibles a la doxiciclina.

AVES

Tratamiento de la colibacilosis, micoplasmosis y enfermedades respiratorias complejas causadas por gérmenes sensibles a la doxiciclina.

TERNEROS (PRE-RUMIANTES)

Tratamiento de enfermedades respiratorias complejas causadas por *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma* spp. y *Manheimia haemolytica* sensibles a la doxiciclina.

El producto está fabricado totalmente de acuerdo con los principios de prácticas correctas de fabricación (PCF) por una planta de fabricación autorizada.

El proceso de validación de datos sobre el producto ha sido presentado de acuerdo con las directivas europeas correspondientes.

DOSIS Y ESPECIES DE DESTINO

Para asegurar una dosificación correcta, el peso corporal debe determinarse con la mayor precisión posible. La ingesta de agua de bebida medicada depende de la condición clínica de los animales.

ESPECIE DE DESTINO	DOXICICLINA POR PESO CORPORAL	APSASOL DOXYCYCLINE	TRATAMIENTO
PORCINA	10 mg doxiciclina por kg peso corporal	200 mg / litro de agua	3 - 5 días consecutivos
AVES	10 - 25 mg doxiciclina por kg peso corporal	66,67 - 133,33 mg / litro de agua	3 - 5 días consecutivos
TERNEROS	10 mg doxiciclina por kg peso corporal	200 mg / litro de agua	3 - 5 días consecutivos

Administrar a través de la leche o sustitutivo de leche, de la solución electrolítica o del agua.
La dosis se ha calculado teniendo en cuenta el consumo diario de agua para cada especie de destino.

GUÍA DE ADMINISTRACIÓN PARA LAS ESPECIES DE DESTINO

El agua de bebida medicada debe ser renovada o reemplazada cada 24 horas si no se consume.

Se recomienda preparar una pre-solución concentrada, aproximadamente 100 gramos de producto por litro de agua de bebida, y diluirla más para concentraciones terapéuticas, si es necesario.

Alternativamente, la solución concentrada puede utilizarse en un medicador de agua proporcional.

La solubilidad del producto depende del pH y puede utilizarse si se mezcla en agua potable dura y alcalina.

Utilice a concentraciones mínimas de 200 mg en polvo por litro de agua de bebida en zonas con agua potable dura y alcalina (dureza superior a 10,2 dH y pH de más de 8,1).

Durante el período de tratamiento los animales no deberán tener acceso a otras fuentes de agua que el agua medicada.

Debido a la variabilidad probable (tiempo, geográfica), la sensibilidad de las bacterias a la doxiciclina (especialmente la sensibilidad a la *Actinobacillus pleuropneumoniae*) puede variar de un país a otro e incluso de una granja a otra. Por lo tanto, se recomiendan muestreos bacteriológicos y pruebas de sensibilidad. El uso del producto debe basarse en el cultivo y sensibilidad de los microorganismos en casos de enfermedad en la granja. Si esto no es posible, la terapia debe basarse en la información epidemiológica (a nivel local, regional, de la granja) sobre la sensibilidad de la bacteria en cuestión.

En caso de no conseguirse la erradicación de los patógenos en cuestión, la medicación deberá, pues, combinarse con prácticas agrícolas correctas, por ejemplo, buena higiene, ventilación adecuada, sin exceso de existencias.

APSASOL DOXYCYCLINE



apsaSOL
antibióticos solubles

Doxiciclina 500 mg / g - Medicamento oral

Solución oral en polvo



Antibiótico a base de tetraciclina semisintética

Acción de amplio espectro inhibidora de bacterias gram positivas y gram negativas, micoplasmas, clamidias, rickettsias y algunos protozoarios

Máxima solubilidad y estabilidad

Especialmente desarrollado para aguas duras (hasta pH 8 - 9)

Alcanza hasta 24 horas en agua medicada

Mejora la palatabilidad para asegurar el consumo máximo de agua en todas las especies

APSASOL DOXYCYCLINE

PROPIEDADES

APSASOL DOXYCYCLINE se usa para el tratamiento de enfermedades respiratorias y del tracto alimentario causadas por bacterias sensibles a la doxiciclina.

La doxiciclina es una tetraciclina semisintética de amplio espectro; es bacteriostática, inhibiendo la síntesis proteica bacteriana que interrumpe el ARN transferencia y el ARN mensajero en los ribosomas.

DOSIS Y ESPECIES DE DESTINO

Cerdos, aves y terneros (pre-rumiantes)

Cerdos: 10 mg de doxiciclina hclato / kilo de peso corporal / día durante 3 a 5 días consecutivos.

Aves: 10-20 mg de doxiciclina hclato / kilo de peso corporal / día durante 3 a 5 días consecutivos.

Terneros (pre-rumiantes) 10 mg de doxiciclina hclato / kilo de peso corporal / día durante 3 a 5 días consecutivos.

Para asegurar una dosificación correcta, debe ajustarse teniendo en cuenta el consumo de agua diaria.

INSTRUCCIONES DE USO

Administración por vía oral en el agua de bebida.

Se recomienda disolver la cantidad requerida en una pequeña cantidad de agua antes de añadir al depósito de agua principal.

Durante el tratamiento, los animales sólo deben beber agua medicada.

TIEMPO DE ESPERA

Carne y vísceras (cerdos, aves y terneros): 7 días.

No está permitido para el uso en aves ponedoras cuyos huevos son para el consumo humano.

No está permitido para el uso en la producción de leche para consumo humano.

PERÍODO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

Período de validez después de la fecha de fabricación: 2 años.

Período de validez después de abierto el envase primario: 1 mes.

Período de validez después de la reconstitución en agua potable: 24 horas.

Período de validez después de la reconstitución en el sustituto de la leche: utilizar inmediatamente.

Almacenar en el envase original en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

UNIDADES DE ENVASE Y EMBALAJE

Polietileno de baja densidad - PEBD (76 µm) - Bolsas de aluminio

200 g	PEBD (76 µm)	50 x 200 g	en cajas de cartón	700 kg	por palé
1 kg	PEBD (76 µm)	15 x 1 kg	en cajas de cartón	1 050 kg	por palé

INTERACCIONES

La absorción de la doxiciclina puede disminuir en presencia de altas cantidades de Ca, Fe, Mg o Al en la dieta. No administrar conjuntamente con preparaciones de antiácidos, caolín y hierro. No administrar junto con vacunas de *Erysipelothrix rhusiopathiae*.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en caso de hipersensibilidad a las tetraciclinas o a alguno de los excipientes. No administrar a animales con severa insuficiencia hepática o renal.

REACCIONES ADVERSAS

Fotosensibilización.

En tratamientos a largo plazo pueden aparecer trastornos digestivos debido a la disbiosis intestinal.

Los datos que se indican en este documento son de carácter meramente informativo y no pueden considerarse como sustitutos de la prescripción. Le rogamos se ponga en contacto con nosotros mediante correo electrónico a export@pintaluba.com para comprobar la prescripción más adecuada según la legislación local.



andrés pintaluba

Andrés Pintaluba SA • Pol. Ind. Agro-Reus • Prudenci Bertrana 5 • 43206 Reus • España
sales@pintaluba.com • www.pintaluba.com



Calle A lote 24 N1-155 y Reinaldo Cruz Parroquia Calderón Quito - Ecuador
Tels.: 2829-069, 2023772 Cel: 0997653713
www.ammrveterinarios.com